OBESIMED® FORTE

Medical device CE 0086 — Bij 10 kg of meer overgewicht

Voor de **behandeling** van **obesitas**
Vermindert honger en voorkomt **overeten**
Voor **substantieel gewichtsverlies**

Algemeen advies: Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u Obesimed® Forte gaat gebruiken, óók als u dit medisch hulpmiddel al eerder heeft gebruikt. De informatie kan zijn aangepast aan de laatste inzichten en gegevens wanneer u aan een nieuwe verpakking begint. Dit medisch hulpmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Obesimed® Forte zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.

Waarvoor wordt Obesimed® Forte gebruikt? Obesimed® Forte is een medisch hulpmiddel dat wordt gebruikt om gewicht te verliezen. Het is bedoeld voor volwassenen van 18 jaar of ouder die meer dan 10 kilo overgewicht hebben of een Body Mass Index (BMI) van 28 of hoger. Voor een goed resultaat wordt aanbevolen om Obesimed® Forte te gebruiken in combinatie met een dieet met verminderde calorie-inname.

De BMI is een methode waarmee u kunt vaststellen of u een gezond lichaamsgewicht hebt of te zwaar bent in verhouding tot uw lengte. Met behulp van onderstaande tabel kunt u bepalen of u overgewicht heeft.

Zoek in de tabel uw lichaamslengte op.

Weegt u minder dan het gewicht dat bij uw lengte vermeld staat, dan moet u geen Obesimed® Forte gebruiken.

Lichaamslengte	Gewicht (kg)
1,50 m	63 kg
1,55 m	67,25 kg
1,60 m	71,75 kg
1,65 m	76,25 kg
1,70 m	81 kg
1,75 m	85,75 kg
1,80 m	90,75 kg
1,85 m	95,75 kg
1,90 m	101 kg

De BMI mag alleen gebruikt worden voor volwassen en is niet in alle gevallen toepasbaar. Deze mag niet gebruikt worden voor kinderen in de groei, zwangere vrouwen en topsporters.

De werking van Obesimed® Forte: De werking van Obesimed® Forte: Obesimed® Forte voorziet in een andere benadering van gewichtsverlies door het gebruik van een combinatie van zuivere, natuurlijke visceuze polysaccharides, die elkaars werking versterken. Obesimed® Forte absorbeert, binnen 30 minuten tot een uur, honderden keren zijn gewicht in water. Zodra de capsule is opgelost zet deze in de maag uit en wordt er een hoog visceuze stabiele gel-matrix gevormd. Dat creëert een vol gevoel, waardoor de portiegrootte van de maaltijd kan worden verkleind en het veel gemakkelijker is om een dieet vol te houden. Na het consumeren van de maaltijd vermengt de gel-matrix zich met het voedsel. Dit zorgt niet alleen voor uitstel van de honger, maar ook voor een vertraging van de spijsvertering. Obesimed® Forte zorgt voor een vermindering van honger door verzadiging van de maag en door de promotie van een gezonde bloedsuikerbalans.

Dosering en gebruik: 3 x daags 1 à 2 capsules, 1 uur voor elke maaltijd innemen met minimaal 1 glas water. De capsule in zijn geheel innemen.

De effectieve dosering kan per persoon verschillen en kan variëren van 1 à 2 capsules per dosering tot de maximale dosering van 3 x daags 6 capsules.

De dosering kan elke 3 dagen worden verhoogd met 1 capsule per maaltijd, totdat de honger duidelijk vermindert en de behoefte aan tussendoortjes verdwijnt. Maximale dosering niet overschrijden.

Obesimed® Forte dient niet langer dan 30 dagen in 1 behandelingsperiode te worden gebruikt. Na 4 dagen kan de behandeling worden hervat.

Dit product is niet geschikt voor kinderen.

Samenstelling: Het product is gebaseerd op plantaardige ingrediënten: Omtec19®, Amylum Solani, OmtecX®, Hypromellose (E464), Titanium oxide (E171).
Het product is geschikt voor vegetariërs.

Allergenen: Dit product bevat geen allergenen.

Gebruik tijdens zwangerschap en/ of borstvoeding: Bij zwangerschap of borstvoeding wordt afgeraden af te vallen, mogelijke schadelijke stoffen uit het vetweefsel kunnen dan bij het kind terecht komen. Het gebruik van de Obesimed® Forte wordt daarom afgeraden.

Gebruik in combinatie met geneesmiddelen: Obesimed® Forte verlaagt de glucosespiegel van het bloed. Als u lijdt aan diabetes is het belangrijk om uw bloedsuikerspiegel goed te monitoren. Overleg in dit geval met uw arts, want mogelijk moet uw medicatie tegen diabetes worden aangepast.

Gebruik van Obesimed® Forte in combinatie met andere dieet supplementen of geneesmiddelen, die een hypoglycemisch effect hebben, wordt afgeraden wanneer er vooraf geen overleg met arts of apotheker is gepleegd.

Obesimed® Forte vertraagt het tempo waarmee voedsel wordt geabsorbeerd en theoretisch kan dit dus ook met geneesmiddelen gebeuren. Orale medicijnen moeten 1 uur voor of 4 uur na gebruik van Obesimed® Forte worden ingenomen. Overleg met uw arts of apotheker wanneer u geneesmiddelen gebruikt, voordat u Obesimed® Forte gaat gebruiken.

Multivitamines en Obesimed® Forte: Tijdens het afvallen en het gebruik van Obesimed® Forte moet u iedere dag een multivitamine- en mineralenpreparaat innemen. Obesimed® Forte kan de opname van bepaalde vitamines en mineralen in het lichaam verminderen. Neem het vitamine- en mineralenpreparaat bij voorkeur voor het slapengaan, om er zeker van te zijn dat de vitamines en mineralen geabsorbeerd worden.

Waarschuwingen:

- Obesimed® Forte dient niet te worden gebruikt bij:
  - overgevoeligheid voor één of meerdere bestanddelen,
  - gastro-intestinale stoornissen,
  - slokdarm stenose of reeds bestaande darm afwijkingen,
  - zwangerschap of borstvoeding.
- Bij twijfel of u Obesimed® Forte mag gebruiken en/of in combinatie met een geneesmiddel mag gebruiken raadpleeg dan uw arts of apotheker,
- Let op! Capsule niet openen voor inname,
- Buiten bereik van jonge kinderen houden.

Mogelijke bijwerkingen: Obesimed® Forte wordt goed verdragen, maar kan enkele bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. In het begin kunnen milde maag- en darmklachten optreden zoals dunne of losse ontlasting, lichte diarree, oprispingen en gasvorming of constipatie. Meestal verdwijnen deze bijwerkingen na een aantal dagen. Om deze bijwerkingen te vermijden kan met een lage dosering worden gestart (1 capsule per maaltijd), waarna de dosering geleidelijk wordt verhoogd, naarmate het lichaam zich aan de dosering heeft aangepast. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze gebruiksaanwijzing is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Totaal netto gewicht: 56 capsules, 51 g.

Wijze van bewaren: Bij kamertemperatuur (15-25°C) op een droge, donkere plaats bewaren, in de originele verpakking, buiten het bereik van kinderen.

Medisch hulpmiddel: De productie geschiedt volgens strenge kwaliteitseisen conform ISO 13485: 2003. Obesimed® Forte is een medisch hulpmiddel klasse IIa conform de medische hulpmiddel richtlijn 93/42/EEC, gewijzigd door MMD 2007/47/EEC.

De Obesimed® Forte informatielijn: Bel voor specifieke vragen over dit medisch hulpmiddel de Obesimed® Forte infolijn: ✆ 0800-73183.
Dit speciale informatienummer is te bereiken tijdens kantooruren.

Uiterste gebruiksdatum: Gebruik van Obesimed® Forte na de datum op de verpakking achter 'niet gebruiken na' wordt afgeraden.

Datum waarop deze gebruiksaanwijzing voor het laatst is herzien: maart 2011 IFU OB 03-11.

PK Benelux BV,
Vluchtoord 17, 5406 XP Uden NL

Distr. Excl. BE-LUX: OCE PHARMA
info@ocepharma.com – t. 03 460 33 55

✆ 0800 – 73183
www.obesimedforte.be

CE 0086

OBESIMED® FORTE

Medical device CE 0086 — Pour un surpoids de 10 kilos ou plus

Pour le **traitement** de **l'obésité**
Réduit la faim et évite de **manger trop**
Pour une **perte de poids substantielle**

Conseil général : Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser Obesimed® Forte, même si vous avez déjà eu recours auparavant à ce produit, car en effet, il peut avoir subi des modifications à la suite de nouvelles recherches et des résultats en découlant. Ce dispositif peut être obtenu sans prescription médicale. Cependant, vous devez utiliser Obesimed® Forte avec le plus grand soin pour parvenir à un résultat optimal. Veuillez conserver le mode d'emploi, il se peut que vous deviez la relire plus tard.

Pourquoi utiliser Obesimed® Forte ? Obesimed® Forte est un dispositif médical utilisé pour perdre du poids. Il est destiné aux adultes de 18 ans ou plus qui présentent une surcharge pondérale de plus de 10 kilos ou un Indice de Masse Corporelle (IMC) de 28 ou plus. Pour un bon résultat, il est recommandé d'utiliser Obesimed® Forte en combinaison avec un régime appauvri en calories.

L'IMC est une méthode qui vous permet de déterminer si votre poids est sain ou trop élevé par rapport à votre taille. Le tableau ci-dessous vous permet d'établir si vous êtes en surpoids.

Recherchez votre taille dans le tableau.

Si vous pesez moins que le poids qui figure à côté de votre taille, vous ne devez pas utiliser Obesimed® Forte.

Taille	Poids (kg)
1,50 m	63 kg
1,55 m	67,25 kg
1,60 m	71,75 kg
1,65 m	76,25 kg
1,70 m	81 kg
1,75 m	85,75 kg
1,80 m	90,75 kg
1,85 m	95,75 kg
1,90 m	101 kg

L'IMC ne peut être utilisé que pour les adultes et n'est pas applicable dans tous les cas. Il ne peut pas être utilisé chez les enfants en pleine croissance, chez les femmes enceintes et chez les sportifs de haut niveau.

Fonctionnement d'Obesimed® Forte : Obesimed® Forte fournit une approche différente de la perte de poids par l'utilisation d'une combinaison de polysaccharides visqueux naturels et très purs qui renforcent l'un l'autre leur action. Obesimed® Forte absorbe en 30 minutes à une heure des centaines de fois son poids en eau. Dès que la gélule est dissoute, elle se dilate dans l'estomac et une matrice de gel stable hautement visqueuse se forme. Celle-ci crée une sensation de satiété permettant de réduire la portion d'aliments à ingérer et ainsi de suivre beaucoup plus facilement un régime. Après avoir consommé le repas, la matrice de gel se mélange aux aliments. Ainsi, non seulement la faim est repoussée, mais la digestion est aussi ralentie. Obesimed® Forte assure une réduction de la faim par une saturation de l'estomac et par la promotion d'un équilibre glycémique salutaire.

Dosage et utilisation : 1 à 2 gélules 3 x par jour, à prendre 1 heure avant chaque repas avec au moins 1 verre d'eau. Absorber la gélule tout entière.

Le dosage efficace peut varier d'une personne à l'autre et peut aller de 1 à 2 gélules par dose jusqu'au dosage maximal de 6 gélules trois fois par jour.

Le dosage peut être augmenté tous les 3 jours de 1 gélule par repas, jusqu'à ce que la sensation de faim diminue clairement et que le besoin de grignoter entre les repas disparaisse. Ne pas dépasser le dosage maximal.

Obesimed® Forte ne doit pas être utilisé pendant plus de 30 jours en 1 période de traitement. Après 4 jours, le traitement peut être repris.

Ce produit ne convient pas aux enfants.

Composition : Le produit est basé sur des ingrédients végétaux : Omtec19®,

Amylum Solani, OmtecX®, Hypromellose (E464), Dioxyde de titane (E171).
Le produit convient aux végétariens.

Allergènes : Le produit ne contient aucun allergène.

Utilisation pendant la grossesse et/ou l'allaitement : Il n'est pas recommandé de maigrir pendant la grossesse ou l'allaitement, car d'éventuelles substances nuisibles provenant du tissu graisseux peuvent atteindre l'enfant. Par conséquent, l'utilisation d'Obesimed® Forte est déconseillée.

Utilisation en combinaison avec des médicaments : Obesimed® Forte réduit le taux de glycémie. Si vous souffrez de diabète, il est important de bien contrôler votre taux de glycémie. Consultez dans ce cas votre médecin, car il se peut que votre médication contre le diabète doit être adaptée.

L'utilisation d'Obesimed® Forte en combinaison avec d'autres compléments alimentaires ayant un effet hypoglycémique similaire est donc déconseillée sans avoir préalablement demandé conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Obesimed® Forte ralentit le rythme avec lequel les aliments sont absorbés et en théorie, il peut en être de même pour les médicaments. Les médicaments à prendre oralement doivent être pris 1 heure avant ou 4 heures après l'utilisation d'Obesimed® Forte. Consultez votre médecin ou votre pharmacien lorsque vous prenez des médicaments avant de commencer à utiliser Obesimed® Forte.

Multivitamines et Obesimed® Forte : Pendant la perte de poids et l'utilisation d'Obesimed® Forte, il est recommandé de prendre chaque jour un complexe de vitamines et de minéraux. Obesimed® Forte peut en effet réduire l'assimilation de certaines vitamines et certains minéraux dans le corps. Prenez ce complexe de vitamines et minéraux de préférence avant d'aller vous coucher, pour être certain que les vitamines et minéraux seront assimilés.

Avertissements :

- Obesimed® Forte ne doit pas être utilisé en cas de :
  - hypersensibilité à un ou plusieurs composants,
  - troubles gastro-intestinaux,
  - sténose de l'œsophage ou anomalies de l'intestin déjà existantes,
  - grossesse ou allaitement.
- En cas de doute quant à savoir si vous pouvez utiliser Obesimed® Forte et/ou l'utiliser en combinaison avec un médicament, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.
- Attention ! Ne pas ouvrir la gélule avant de l'ingérer.
- Garder hors de portée des jeunes enfants.

Effets indésirables éventuels : Obesimed® Forte est bien supporté, mais il peut provoquer certains effets indésirables, chez certaines personnes seulement. Au début, de légers troubles gastriques et intestinaux peuvent se produire, comme des selles molles, une légère diarrhée, des renvois et des gaz ou de la constipation. Généralement, ces effets indésirables disparaissent après quelques jours. Pour éviter des effets indésirables, il est possible de commencer avec un faible dosage (1 gélule par repas), après quoi vous pouvez progressivement augmenter le dosage, au fur et à mesure que le corps s'est habitué au dosage. Lorsqu'un des effets indésirables est important ou lorsque'un effet indésirable qui ne figure pas dans le mode d'emploi survient, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.

Poids net total : 56 gélules de 51 g.

Mode de conservation : Conserver à température ambiante (15-25°C) dans un endroit sec et sombre, dans l'emballage d'origine et hors de portée des enfants.

Dispositif médical : La fabrication des gélules répond à des exigences de qualité très strictes conformément à la norme ISO 13485: 2003. Obesimed® Forte est un dispositif médical de classe IIa conformément à la directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE, modifié par MMD 2007/47/CEE.

Ligne d'information Obesimed® Forte: Pour toute question spécifique concernant ce dispositif médical, appelez la ligne d'information Obesimed® Forte : ✆ 0800-73183. Ce numéro d'information spécial est accessible pendant les heures de bureau.

Date limite d'utilisation : L'utilisation d'Obesimed® Forte après la date indiquée sur l'emballage après la mention 'à consommer avant le' est déconseillée.

Date de la dernière révision du mode d'emploi: mars 2011 IFU OB 03-11.

PK Benelux BV,
Vluchtoord 17, 5406 XP Uden NL

Distr. Excl. BE-LUX: OCE PHARMA
info@ocepharma.com – t. 03 460 33 55

✆ 0800 – 73183

www.obesimedforte.be

CE 0086

OBESIMED® FORTE

Medical device CE 0086 — Bei 10 Kilo oder mehr Übergewicht

Zur **Behandlung** von **Obesitas**
Verringert den Appetit und verhindert **Überessen**
Für **substanzielle Gewichtsreduzierung**

Allgemeiner Empfehlungen: Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam, bevor Sie Obesimed® Forte anwenden, auch wenn Sie dieses Medizinprodukt bereits früher verwendet haben. Die Informationen können den neuesten Erkenntnissen und Daten angepasst sein, wenn Sie mit einer neuen Packung beginnen. Dieses Medizinprodukt ist rezeptfrei. Trotzdem müssen Sie Obesimed® Forte sorgfältig anwenden, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf, eventuell benötigen Sie ihn noch einmal.

Wann wird Obesimed® Forte eingesetzt? Obesimed® Forte ist ein Medizinprodukt zur Unterstützung von Gewichtsverlust. Es ist für Erwachsene ab 18 Jahren geeignet, die mehr als 10 Kilo Übergewicht oder einen Body Mass Index (BMI) von 28 oder höher haben. Für ein gutes Ergebnis wird empfohlen, Obesimed® Forte in Kombination mit einer Diät mit verringerter Kalorien-Zuführung zu gebrauchen.

Mit dem BMI kann festgestellt werden, ob Sie ein gesundes Körpergewicht haben oder ob Sie im Verhältnis zu Ihrer Körpergröße zu schwer sind. Mit Hilfe folgender Tabelle können Sie feststellen, ob Sie übergewichtig sind.

Suchen Sie in der Tabelle Ihre Körpergröße.

Wenn Sie weniger wiegen als das Gewicht zu Ihrer Körpergröße, brauchen Sie kein Obesimed® Forte.

Körpergröße	Gewicht (kg)
1,50 m	63 kg
1,55 m	67,25 kg
1,60 m	71,75 kg
1,65 m	76,25 kg
1,70 m	81 kg
1,75 m	85,75 kg
1,80 m	90,75 kg
1,85 m	95,75 kg
1,90 m	101 kg

Der BMI darf nur bei Erwachsenen angewendet werden und ist nicht in allen Fällen anwendbar. Er gilt nicht für Kinder im Wachstum, Schwangere und Spitzensportler.

Die Wirkung von Obesimed® Forte: Obesimed® Forte bietet einen anderen Ansatz, Gewichtsverlust durch eine Kombination aus reinen, natürlichen viskosen Polysacchariden zu erreichen, die sich in ihrer Wirkung gegenseitig verstärken. Obesimed® Forte absorbiert innerhalb von 30 Minuten bis zu einer Stunde hundert Mal sein Gewicht in Wasser. Wenn sich die Kapsel aufgelöst hat, bildet sich im Magen eine viskose, stabile Gel-Matrix. Das sorgt für ein Sättigungsgefühl, sodass die Portionsgröße der Mahlzeit verringert werden kann und es viel leichter fällt, eine kalorienreduzierte Diät durchzuhalten. Nach der Mahlzeit vermischt sich die Gel-Matrix mit dem Essen. So wird nicht nur das Hungergefühl verschoben, sondern auch die Verdauung verzögert. Obesimed® Forte reduziert den Appetit ab durch Sättigung des Magens und durch die Förderung eines gesunden Blutzuckerspiegels.

Dosierung und Anwendung: 3 x täglich 1-2 Kapseln, 1 Stunde vor jeder Mahlzeit mit mindestens einem Glas Wasser einnehmen. Die Kapsel ganz schlucken. Die effektive Dosierung kann pro Person von 1 bis 2 Kapseln je Dosis bis zur Höchstdosierung von 3 x täglich 6 Kapseln variieren.

Die Dosis kann alle drei Tage um eine Kapsel pro Mahlzeit erhöht werden, bis sich den Appetit deutlich verringert und der Bedarf nach Zwischenmahlzeiten verschwindet. Höchstdosis nicht überschreiten.

Obesimed® Forte soll in einer Behandlungsphase nicht länger als 30 Tage verwendet werden. Nach vier Tagen kann die Behandlung wieder aufgenommen fortgesetzt werden.

Dieses Produkt ist für Kinder ungeeignet.

Zusammensetzung: Das Produkt ist auf pflanzlicher Basis. Omtec19®, Amylum Solani, OmtecX®, Hypromellose (E464), Titaniumoxid (E171).
Das Produkt ist für Vegetarier geeignet.

Allergene: Dieses Produkt enthält keine Allergene.

Einnahme während der Schwangerschaft oder Stillzeit: Bei Schwangerschaft oder Stillzeit wird davon abgeraten abzunehmen. Eventuelle Schadstoffe aus dem Fettgewebe können dann zum Kind gelangen. Daher wird in diesem Fall von der Einnahme von Obesimed® Forte abgeraten.

Einnahme in Kombination mit Medikamenten: Obesimed® Forte senkt den Glukosespiegel im Blut. Wenn Sie unter Diabetes leiden, ist es wichtig, den Blutzuckerspiegel gut zu beobachten. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Arzt, möglicherweise muss Ihre Medikation gegen Diabetes angepasst werden.

Von der Einnahme von Obesimed® Forte in Kombination mit anderen Diät-Ergänzungsstoffen oder Medikamenten mit hypoglycemischem Effekt ohne Rücksprache mit Arzt oder Apotheker wird abgeraten.

Obesimed® Forte verlangsamt das Tempo der Speisenaufnahme und dies kann theoretisch auch auf Medikamente wirken. Orale Medikamente müssen 1 Stunde vor oder 4 Stunden nach der Einnahme von Obesimed® Forte eingenommen werden. Wenn Sie Medikamente einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie mit der Einnahme von Obesimed® Forte beginnen.

Multivitamine und Obesimed® Forte: Während des Abnehmens und der Einnahme von Obesimed® Forte müssen Sie jeden Tag ein Multivitamin- und Mineralienpräparat einnehmen. Obesimed® Forte verringert die Aufnahme bestimmter Vitamine und Mineralien im Körper. Nehmen Sie das Vitamin- und Mineralienpräparat am besten vor dem Schlafengehen ein, um sicher zu sein, dass die Vitamine und Mineralien aufgenommen werden.

Warnhinweise:

- Obesimed® Forte darf nicht eingenommen werden bei:
  - Unverträglichkeit eines oder mehrerer Bestandteile
  - gastrointestinalen Störungen
  - Speiseröhrenverengung oder bereits bestehenden Darmabweichungen
  - Schwangerschaft oder Stillzeit
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie Obesimed® Forte alleine oder in Kombination mit anderen Medikamenten anwenden dürfen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
- Achtung! Kapsel vor Einnahme nicht öffnen.
- Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.

Mögliche Nebenwirkungen: Obesimed® Forte ist gut verträglich, kann bei einigen Menschen aber Nebenwirkungen verursachen. Zu Beginn können leichte Magen-Darm-Beschwerden auftreten wie dünne Stühle, leichter Durchfall, saures Aufstoßen, Flatulenz oder Verstopfung. Meistens verschwinden diese Nebenwirkungen nach ein paar Tagen. Um sie zu vermeiden, kann man mit einer niedrigeren Dosis beginnen (1 Kapsel pro Mahlzeit), um sie dann allmählich zu steigern, je nachdem, wie sich der Körper der Dosierung angepasst hat. Wenn eine der Nebenwirkungen ernsthaft wird oder wenn bei Ihnen eine Nebenwirkung auftritt, die nicht in diese Gebrauchsanweisung, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gesamtgewicht Netto: 56 Kapseln 51 Gramm.

Lagerung: Bei Zimmertemperatur (15-25°C) an einem trockenen, dunklen Platz in Originalverpackung aufbewahren außerhalb der Reichweite von Kindern.

Medizinprodukt: Die Herstellung erfolgt nach strengen Qualitätsnormen gemäß ISO 13485: 2003. Obesimed® Forte ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa, der Richtlinie 93/42/EWG geändert durch Medizinprodukterichtlinie MMD 2007/47/EWG.

Das Obesimed® Forte Infotelefon: Rufen Sie bei Fragen zu diesem Mittel das Obesimed® Forte Infotelefon an: ✆ 0800-73183.
Diese Informationsnummer ist zu den Bürozeiten erreichbar.

Verwendbar bis: Von der Einnahme von Obesimed® Forte nach dem auf der Verpackung angegebenen Datum wird abgeraten.

Letzte Bearbeitung diese Gebrauchsanweisung: März 2011 IFU OB 03-11.

PK Benelux BV,
Vluchtoord 17, 5406 XP Uden NL

Distr. Excl. BE-LUX: OCE PHARMA
info@ocepharma.com – t. 03 460 33 55

✆ 0800 – 73183

www.obesimedforte.be

CE 0086